大阪厚生年金病院

日本医療機能評価機構認定病院

経営受託者	財団法人 厚生年金事業振興団
病床数・診療科	570床 21診療科
職員数	約650名
平均在院日数・ 患者紹介率	13.0日 60%
年間救急患者	約12,000人 (月間約1000人)
医師数	160名(研修医27名)

1

抗菌薬の適正使用について

■ 何のために適正使用が必要か？

1. 広域抗菌薬の濫用による耐性菌(MRSAなど)の増加を抑制でき、これによる院内感染のリスクを減少できる
2. 適切な抗菌薬を使用することで、治療期間の短縮、救命を図ることができる
3. 医療費の節減ができる(特にDPC導入下で)

2

当院のInfection Control Team (ICT)の 構成メンバー(2006年5月現在)

主任:ICD

- ICN
- コアリンクナース 3名
- コアリンクドクター 2名(外科医・小児科医)
- 臨床検査技師 1名
- 薬剤師 1名
- 事務職員 1名
- 歯科衛生士 1名
- オブザーバー:副院長・副看護部長 計13名

3

当院ICTの主な活動内容(2005年度)

- 月2回のICTミーティングの開催
- 感染予防対策委員会への感染予防対策案の提出
- 院内感染患者の把握とサーベイランスの計画・立案・実施
- 各種感染対策の立案とマニュアルの改訂
- アウトブレイクの対応
- 隔月のICTニュースの発行
- ICT回診の実施、研修医への抗菌薬使用の指導
- 感染症に関する全科からのコンサルテーションへの対応
- 職業感染対策(ツ反、HBワクチンやインフルエンザ、風疹・麻疹・水痘などの抗体測定とワクチン実施率の向上)
- **抗菌薬使用状況の把握と特定抗菌薬使用許可制の徹底**
- **当院における抗菌薬使用マニュアルの作成と活用**

4

米国CDCでの院内感染防止の 効果に関する研究

- SENICプロジェクト(1974-1984)研究結果
- 4つの主要な感染(尿路感染・肺炎・術創感染・敗血症)がすべての院内感染の85%を占め、在院日数を延長させた
- 院内感染低減のための重要な要素
 - ・集中的なサーベイランス
 - ・集中的な管理(抗菌薬の適正使用など)
 - ・適切な感染管理コーディネータの配置
 - ・訓練された感染管理医師

5

抗菌薬適正使用についての チェック項目

- 感染か否かの鑑別(薬剤熱も意外に多い)
- 感染とすれば感染源(フォーカス)はどこか
- 感染源、病態からどのような起因菌が推定されるか
- 血液培養や痰・尿・膿汁などから検体の提出がなされているか
- グラム染色がなされているか、好中球による貪色像は確認されているか
- 起因菌にふさわしくかつ臓器移行のよい抗菌薬は何か
- 重症度に応じた抗菌薬の量が適切に使用されているか
- 血中濃度測定はなされているか

6

黄色ブドウ球菌におけるMRSAの割合 経年的変化

	2003.4～04.3	2004.4～05.3	2005.4～06.3
外 来	28.9%	35.5%	36.2%
入 院	67.8%	65.2%	64.8%

7

特定抗菌薬使用許可制について

(2002年3月導入)

* 2000年11月より特定抗菌薬使用届出制実施

ICDの許可が必要な特定抗菌薬

(2006年5月現在)

カルバペネム系 : MEPM(メロペン[®])

第4世代セフェム系 : CPR(ブロアクト[®])

ニューキノロン系注射薬 : CPMX(シプロキサ[®])
PZFX(パシル[®])

抗MRSA薬 : VCM(バンコマイシン[®])

TEIC(タゴシッド[®])

ABK(ハベカシン[®])

抗真菌薬 : MCFG(ファンガード[®])

VRCZ(ヴィフェンド[®])

8

感染予防対策委員会殿

【特定抗菌薬使用届け】

平成16年10月改訂

(特定抗菌薬:バンコマイシン・ハベカシン・タゴシット・プロアクト・メロペン・注射用シプロキサ、ファンガード)

この薬剤は血中濃度をオーダーしてください。

(ICTの許可: 済み)

***注意:原則として『ICTの許可』及び『特定抗菌薬使用届け』の無い場合、上記薬剤は使用できません。**

主治医 科 先生 _____ 提出日:平成 年 月 日

患者: 科 病棟 _____ 患者氏名(イニシャル) _____ 年齢 才・男・女 _____

病名・基礎疾患 _____ 感染部位 _____ 起因菌: _____

入院日:平成 年 月 日 _____

使用抗菌薬 _____ 併用抗菌薬 _____ 抗菌薬使用量 _____ g/day(分1・分2・分3) _____
使用予定期間 _____ 日間 _____ (その他: _____) (2週間を超える場合はICTより連絡あり)

抗菌薬の使用目的 _____
・Empiric therapy
・感受性試験に基づく感染制御
・除菌
・その他

抗菌薬使用上の疑問点 _____
・0(例)腎不全時の使用量は? バンコマイシンとハベカシンは併用可能?

(ここまで主治医が記入ください)

ICT記入欄

受付日 _____ 受付サイン _____ 担当医→薬剤部→ICT _____

◆大阪厚生年金病院 感染予防対策委員会◆

9

大阪厚生年金病院における 抗菌薬使用マニュアル (平成15年5月改訂版)

当院において各診療科から提出される痰、尿、血液、
膿汁などの細菌培養結果と、院内にある抗菌薬に対
するこれら細菌の感受性表、抗菌薬の組織移行性な
どをもとに作成したマニュアル
(一定のガイドライン作りが目標)。

10

カルバペネム系(メロペン[®]・カルベニン[®]注) の使用状況

(3ヶ月単位の
使用本数)

11

当院の抗MRSA薬の使用状況

(本)

12

医療費の変化

- 許可制導入前後6ヶ月の抗MRSA薬3剤の薬剤費合計を比較すると.....

導入前 12,757,127円

導入後 6,692,089円

(年間約1200万円の節減)

抗MRSA薬の医療費は47.5%減少

- (カルバペネム系薬では年間約3500万円節減)

13

当院のセフェム系抗生剤の使用状況

14

MRSA感染率と速乾性手指消毒剤の使用量との関係

15

当院における各種感染症対策マニュアル 2005年版（全項目を毎年改訂中）

- スタンダードプリコーションについて
- 感染経路別対策案
- HBV,HCV感染対策マニュアル
- 結核対策マニュアル
- MRSA対策マニュアル
- 感染性下痢症対策マニュアル
- 疥癬対策マニュアル
- インフルエンザ対策マニュアル
- HIV対策マニュアル
- 清潔隔離対策マニュアル
- SARS対策マニュアル
- ウイルス性角結膜炎対策マニュアル
- **大阪厚生年金病院における抗生剤使用マニュアル**

16

大阪厚生年金病院の院内感染率 (ホスピタルワイドサーベイランス) Attack rate (%)

Attack rate = 院内感染患者数 / 総入院患者数 (%)

17

ICT回診の風景

18

臨床研修医への感染症教育について

- 毎週のICT回診で、長期抗菌薬を使用しているケースや、発熱が持続している症例を事前に取り上げ、担当医である研修医とディスカッションを行う。(本当に感染か、感染部位は、起因菌は何が推定されるかなど)
- 院内で感染症に対するコンサルテーションを随時受けつける(1日10-20件)
- 毎週水曜日朝の内科研修医カンファレンスでは8-10例の新入院症例を取り上げ、内半分は感染症について討論する。
- 特定抗菌薬については使用許可制であるため、それが適切な使用であるか、常に研修医とディスカッションをし、抗菌薬の適正使用について教育してゆくことが可能。